



## 布地奈德鼻喷雾剂说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

### 【药品名称】

通用名称：布地奈德鼻喷雾剂

商品名称：雷诺考特

英文名称：Budesonide Nasal Spray

汉语拼音：Budinaide Bipenwuji

### 【成份】

本品主要成份为布地奈德。每毫升含布地奈德 0.64 毫克。辅料为：无水葡萄糖；微晶纤维素和羧甲基纤维素钠；聚山梨酯 80；乙二胺四乙酸二钠；山梨酸钾。

### 【性状】

本品为白色至类白色粘稠混悬液。

### 【作用类别】

本品为耳鼻喉科用药类非处方药药品。

### 【适应症】

预防和治疗常年性及季节性过敏性鼻炎，也可用于血管舒缩性鼻炎。

### 【规格】

每瓶 120 喷，每喷含布地奈德 32  $\mu\text{g}$ ，药液浓度为 0.64 mg/ml。

### 【用法用量】

鼻腔喷入：左手喷右侧鼻孔，右手喷左侧鼻孔，避免直接喷向鼻中隔。

成人：开始时每个鼻孔各 2 喷，早晚各 1 次。一日最大用量不超过 8 喷（256 微克）。症状缓解后每天每个鼻孔喷 1 次，每次 1 喷。

6 岁以上儿童：同成人。

### 【不良反应】

成人及 12 岁以上儿童患者中，在安慰剂对照临床试验中大于 1% 会发生以下不良事件。

常见（ $\geq 1/100$  但  $< 1/10$ ）：

感染与侵染：上呼吸道感染、尿路感染。

呼吸，胸部和纵隔疾病：哮喘、鼻衄、口咽痛。

不常见（ $\geq 1/1000$  但 $<1/100$ ）：皮肤和皮下组织疾病：接触性皮炎、荨麻疹。

6岁至12岁以下的儿童患者中，在安慰剂对照临床试验中大于1%会发生以下不良事件。

常见（ $\geq 1/100$  但 $<1/10$ ）：

胃肠道疾病：腹部不适。

一般疾病和给药部位状态：发热。

感染与侵染：中耳炎、咽炎、鼻炎、上呼吸道感染、支气管炎、呼吸道感染、鼻窦炎、扁桃体炎。

神经系统疾病：头痛。

呼吸，胸部和纵隔疾病：哮喘、咳嗽、鼻衄、口咽痛。

皮肤和皮下组织疾病：皮疹。

约5%的患者会发生局部刺激的不良反应。

常见（ $>1/100$ ）：气道：局部刺激、轻微的血性分泌物、鼻出血。

少见（ $<1/1000$ ）：全身：血管性水肿。

皮肤：红斑、荨麻疹、皮疹、皮炎、瘙痒。

气道：鼻中隔穿孔和黏膜溃疡。

免疫系统：速发型过敏反应。

速发（I型）或迟发（IV型）的过敏反应，包括红斑、荨麻疹、皮疹、皮炎、血管神经性水肿和瘙痒已有报道。极少数病人在鼻腔内给予糖皮质激素后出现黏膜溃疡和鼻中隔穿孔。这些不良反应的原因（可能由糖皮质激素、这些疾病或其他因素引起）尚不清楚。

## 【禁忌】

对布地奈德或处方中任一成份有过敏史者。

## 【注意事项】

1. 使用本品14天后，症状仍未改善，请咨询医师。

2. 自我治疗时间不得超过3个月，如需要超过3个月，应在医师指导下使用。

3. 长期使用高剂量，可能发生糖皮质激素的全身作用。长期接受本品治疗的儿童和青少年，可能引起生长发育迟缓，应在医师指导下使用。潜在的全身效应可能包括库欣氏综合征，库欣氏外貌特征，肾上腺抑制，儿童和青少年发育迟缓，白内障，青光眼等，以及更罕见的一

系列心理或行为效应，包括精神运动功能亢进，睡眠障碍，焦虑，抑郁或攻击性行为（特别是儿童）。与口服糖皮质激素相比，这些效应发生的可能性要小得多，并且不同患者和不同的糖皮质激素制剂之间可能有所不同

4. 6岁至12岁以下儿童：如果您的孩子每年需要使用本喷雾剂超过两个月，请与您孩子的医生联系。

5.伴有鼻部真菌感染和疱疹的患者慎用。

6.使用全身性糖皮质激素转而使用本品者，应在医师指导下使用。

7.肺结核患者慎用。

8.如患有或曾接触过结核病，水痘或麻疹患者，在使用本品前请咨询医生。

9.本品仅为鼻腔用药，不得接触眼睛，若接触眼睛，请立即用水清洗。

10.如视力有任何变化，请停止使用本品并咨询医生。

11.6岁以下儿童不推荐使用本品。

12.孕妇及哺乳期妇女应避免使用本品。

13.运动员慎用。

14.如服用过量或出现严重不良反应，应立即就医。

15.对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

16.本品性状发生改变时禁止使用。

17.请将本品放在儿童不能接触的地方。

18.儿童必须在成人监护下使用。

19.如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

20.本品与其他糖皮质激素类药物联合使用时，可能会降低某些儿童的生长速度。

21.同时使用吸入性布地奈德和细胞色素P450抑制剂，特别是同工酶CYP3A4（即含可比西他的产品，酮康唑，利托那韦，阿扎那韦，克拉霉素，茚地那韦，伊曲康唑，奈法唑酮，奈非那韦，沙奎那韦，泰利霉素）增加了布地奈德在血浆中的浓度，导致全身副作用的风险增加，如库兴氏综合征和肾上腺抑制。如果使用，建议密切监测患者的全身作用。除非该益处大于风险，否则，应避免结合使用。酮康唑伴随布地奈德的短期使用（1至2周）与临幊上显著的药物相互作用无关。

22.如曾被诊断为青光眼、白内障，或患有所部感染、糖尿病，在使用本品前请咨询医生。

23.如出现感染的症状或体征，如持续发热，请咨询医生。

24. 如有严重或频繁地流鼻血，近期鼻溃疡，鼻部手术或有未愈合的鼻损伤，请咨询医生。

25. 如症状持续或恶化，或出现新症状，请停止使用并咨询医生。

#### 【药物相互作用】

1. 应避免与酮康唑合用。

2. 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

#### 【药理作用】

本品为糖皮质激素类药物，具有强效的局部抗炎与抗过敏作用。

#### 【贮藏】

不超过 30°C，不可冷冻。

#### 【包装】

120 喷/支，1 支/盒；2 支/盒

内包装容器为棕色玻璃瓶，配有鼻配适器；

#### 【有效期】

24 个月。

#### 【执行标准】

进口药品注册标准 JX20170302

#### 【批准文号】

进口药品大包装注册证号：H20171310

进口药品小包装注册证号：H20171309

分包装批准文号：国药准字 J20180024

#### 【说明书修订日期】 2020 年 06 月 30 日

#### 【药品上市许可持有人】

名称：McNeil Sweden AB

注册地址：Box 4007, SE-169 04 Solna, 瑞典

#### 【生产企业】

企业名称：AstraZeneca AB

生产地址：SE-151 85 Sodertalje, 瑞典

分包装企业名称：上海强生制药有限公司

分包装地址：上海市闵行经济技术开发区南雅路 219 号

邮政编码：200245

电话号码：800-820-1188 400-888-3060

**如有问题可与生产企业联系**

### **如何使用布地奈德鼻喷雾剂**

使用布地奈德鼻喷雾剂前请阅读说明书，小心遵守使用说明。

### **使用方法**

注意：第一次用药前，振摇药瓶然后向空气中喷压药剂数次（5-10 次），以获得均匀的喷雾（见图）。若一整天不使用，再次使用前需重复上述操作，惟此次只需对空气喷压一次即可。

1. 搁鼻，振摇药瓶，打开棕色的保护盖。
2. 照图示姿势握住药瓶。（图 1）
3. 将喷头插入鼻孔，喷压处方规定的剂量。同法在另一鼻孔喷药。（图 2）
4. 盖上瓶盖，喷药次数不要超过医生处方量。




图 1



图 2

### **儿童**

儿童必须在成人的监督下使用本药，以确保其依处方量正确给药。

### **清洁**

定期清洁药瓶上部的塑料部分，打开瓶盖，拧开白色喷头，在温水中清洗塑料部分，在空气中晾干然后重新装上药瓶。

**雷诺考特®**