



立复汀[®]

盐酸左卡巴斯汀鼻喷雾剂说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】

通用名称：盐酸左卡巴斯汀鼻喷雾剂

商品名称：立复汀[®]

英文名称：Levocabastine Hydrochloride Nasal Spray

汉语拼音：Yansuan Zuokabasiting Bipenwuji

【成份】

本品每瓶含主要成份左卡巴斯汀 5 毫克。

辅料为：丙二醇、无水磷酸氢二钠、一水磷酸二氢钠、羟丙甲基纤维素、吐温 80、苯扎氯铵、依地酸二钠和纯水。

【性状】

本品为含微细颗粒的混悬液，静置后微细颗粒下沉，振摇后成均匀的白色混悬液。

【作用类别】

本品为抗过敏药类非处方药药品。

【适应症】

过敏性鼻炎的症状治疗。

【规格】

10 毫升: 5 毫克（按左卡巴斯汀计），每瓶 100 揆，每揆含左卡巴斯汀 50 微克

【用法用量】

本品在用前必须摇匀。

成人和儿童：常规剂量每鼻孔每次喷2揆，每日2次。也可增加至每次每鼻孔喷2揆，每日3~4次，连续用药直至症状消除。

患者在用药前必须清洗鼻道（如擤鼻涕等），喷药时将药物吸入。第一次喷药前使气雾泵源充满，直至能很好地喷出气雾，然后再开始使用。

【不良反应】

1. 偶有使用本品后，出现暂时而轻微的局部刺激（鼻刺痛和烧灼感）的报道。 $\geq 1\%$ 的受试者报告的不良反应有：恶心、疲乏、疼痛、鼻窦炎、头痛、嗜睡、头晕、咽喉疼痛、鼻出血、咳嗽。 $< 1\%$ 的受试者报告的不良反应有：给药部位刺激、给药部位疼痛、给药部位干燥、给药部位灼伤、给药部位不适、鼻腔不适、鼻塞。
2. 上市以来，以下药物不良反应有很少的报告：超敏反应、过敏、呼吸困难、支气管痉挛、心悸、心动过速、鼻塞、鼻出血、头痛、眼睑水肿、疲乏、全身不适和用药部位反应（包括鼻部水肿和鼻腔不适）。

【禁忌】

对本品中的成分过敏者禁用。

【注意事项】

1. 肾功能不全患者应在医师指导下使用。
2. 通常情况下，本品无镇静作用，对精神运动性活动亦无影响。故汽车驾驶员和机械操作患者可以使用本品。需警告的是嗜睡仍可能发生，如发生该情况，应停止驾驶机、车、船、从事高空作业、机械作业及操作精密仪器。
3. 3岁以下儿童及老年人应在医师指导下使用。
4. 除非特别需要，孕妇不宜使用本品。哺乳期妇女应慎用。孕妇及哺乳期妇女使用本品前需咨询医师或药师。
5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
6. 本品性状发生改变时禁止使用。
7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
8. 儿童必须在成人监护下使用。

9.如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

10.若过量服用本品，可能出现镇静作用。一旦发生以上症状，应饮用大量清水以便加快左卡巴斯汀的肾脏清除。

【药物相互作用】

1.临床实验中沒有本品与酒精或任何其他药物产生相互作用的报告。在一次特殊设计的精神作用研究中，未见与安定有相互作用，但不能排除与酒精有轻微的相互作用。

2.如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【药理作用】

盐酸左卡巴斯汀是一种强效、长效、速效、具有高度选择性的组胺 H1 受体拮抗剂。局部应用于鼻部，几乎立刻起效，消除过敏性鼻炎的典型症状（喷嚏、鼻痒、流涕），作用可维持数小时。

【贮藏】

15-30°C 保存

【包装】

塑料瓶装，10 毫升/瓶，1 瓶/盒

【有效期】

24 个月

【执行标准】

进口药品注册标准：JX20190144

【批准文号】

国药准字 HJ20160305

【说明书修订日期】

2021 年 04 月 22 日

【药品上市许可持有人】

名称：JOHNSON & JOHNSON CONSUMER N.V.

注册地址：Antwerpseweg 15-17 BE-2340 Beerse, Belgium

【生产企业】

企业名称：Janssen Pharmaceutica N.V.

生产地址：Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgium

分包装企业名称：上海强生制药有限公司

Shanghai Johnson & Johnson Pharmaceuticals, Ltd.

分包装地址：上海市闵行经济技术开发区南雅路 219 号

邮政编码：200245

电话号码：400-888-3060

传真号码：021-62824529

如有问题可与生产企业联系

LIVOSTIN[®]