

氯雷他定口腔崩解片说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。

【药品名称】

通用名称：氯雷他定口腔崩解片
英文名称：Loratadine Orally Disintegrating Tablets
汉语拼音：Lüleitading Kouqiangbengjiepian

【成份】
本品每片含氯雷他定10毫克。辅料为：普鲁兰、甘氨酸、黄原胶。

【性状】

本品为白色或类白色疏松片，在口腔内迅速崩解，无沙砾感。

【作用类别】

本品为耳鼻喉科及皮肤科用药类非处方药品。

【适应症】

用于缓解过敏性鼻炎有关的症状，如喷嚏、流涕、鼻痒、鼻塞以及眼部痒及烧灼感。口服药物后，鼻和眼部症状及体征得以迅速缓解。亦适用于缓解慢性荨麻疹、瘙痒性皮肤病及其他过敏性皮肤病的症状及体征。

【规格】

每片含氯雷他定10毫克。

【用法用量】

空腹服。取出本品置于口中，不需用水，无须咀嚼，本品迅速崩解，随唾液吞入胃。
成人及12岁以上儿童：一日1次，一次1片（10毫克）。
2~12岁儿童：体重>30公斤，一日1次，一次1片（10毫克）。
体重≤30公斤：一日1次，一次半片（5毫克）。
用于手撕开软背包装，取出药片，置于口中，药片将迅速崩解，随唾液吞服即可。服用不需水；不建议将药片掰开服用。

【不良反应】

在每天10毫克的推荐剂量下，本品未见明显的镇静作用。常见不良反应有乏力、头痛、嗜睡、口干、胃肠道不适包括恶心、胃炎以及皮疹等。罕见不良反应有脱发、过敏反应、肝功能异常、心动过速及心悸等。

【禁忌】

特异体质的病人禁用。

息斯敏®牌

口腔崩解片使用说明
请勿在撕开顶铝前直接推挤
铝板泡罩取出药片
请轻取药片，如药片破碎不
影响其疗效



1

保持手部干燥，手指在半圆切口处
沿箭头方向轻轻将铝箔纸撕开。



2

手指向上轻轻挤压双铝泡罩底部，
使氯雷他定口腔崩解片脱离泡罩。



3

将氯雷他定口腔崩解片取出，置于
口中，药片随唾液迅速溶解。

无需用水入口即溶

【注意事项】

1. 严重肝功能不全的患者请在医生指导下使用。
2. 妊娠期及哺乳期妇女慎用。
3. 在做皮试前约48小时左右应中止使用本品，因抗组胺药能阻止或降低皮试的阳性反应而发生。
4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
5. 本品性状发生改变时禁止使用。
6. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
7. 儿童必须在成人监护下使用。
8. 老年人应在医师指导下使用。
9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】

1. 同时服用酮康唑、大环内酯类抗生素、西咪替丁、茶碱等药物，会提高氯雷他定在血浆中的浓度，应慎用。其他已知能抑制肝脏代谢的药物，在未明确与氯雷他定相互作用前应谨慎服用。
2. 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【药理作用】

本品为高效、作用持久的三环类抗组胺药，为选择性外周H1受体拮抗剂。可缓解过敏引起的各种症状。

【贮藏】 避光，密闭保存。

【包装】 双铝包装。10片/板盒。

【有效期】 24个月。

【执行标准】 国家食品药品监督管理局标准 YBH03652008

【批准文号】 国药准字 H20080190

【说明书修订日期】 2011年09月07日

【生产企业】

企业名称： 陕西量子高科药业有限公司
生产地址： 陕西省渭南高新技术开发区东风大街（西段）6号
邮政编码： 714000
电话号码： 0913-8190812
传真号码： 0913-8190806
网 址： www.qhtg.com

如有问题可与生产企业联系
免费咨询电话： 800 840 9688